

Név:				Beküldő neve:				Orvosi körpecsét
Születési név:				Beküldő címe:				
TAJ/ID:				9 jegyű kód:				Pecsét száma:
Születési dátum:	Nem:	ffi	nő	Orvos neve:	Tel:			
Lakcím (helység):	Tel:			Térítés módja:	Helyben fizető	Csekkel előre*	Átutalás előre*	Szerződés
Lakcím (utca,hsz.):				Befizetés azonosító:				Orvos aláírása
Iránydiag./BNO:				Számlázási név:				Beutaló kelte:
				Számlázási cím:				Mintav. dátuma:
				Leletküldési e-mail:				*A befizetést igazoló csekket, átutalási bizonylatot a kéréshez kell csatolni! A vizsgálat eredményét csak az igazolás birtokában tudjuk kiadni.

**A KÉRŐLAPON TALÁLHATÓ VIZSGÁLTATOKRA KÜLÖN MINTAVÉTELI CSŐ LEVÉTELE SZÜKSÉGES!!**Amennyiben nem találja egyik kérelmponton sem az igényelni kívánt vizsgálatot, kérjük írjon az [ugyfelszolgalat@synlab.com](mailto:ugyfelszolgalat@synlab.com) e-mail címre!

KLINIKAI KÉMIA	KÓD	ENDOKRINOLÓGIA	KÓD	GYÓGYSZERSZINT
		Erythropoetin	EPO	Lamotrigin
CK izoenzimok (makro-CK)	MCK CKISO	Adrenalin	2 ADRE	Levetiracetam
Amyloid A	SAA	Noradrenalin	2 NORA	Methylphenidate (Ritalin)
Angiotenzin konvertáló enzim	ACE	Dopamin	2 DOPA	
Amiláz izoenzimok	AMISO	Metanephrin	♦ 2 METAN	<b>EGYÉB EGYEZTETETT</b>
		Normetanephrin	♦ 2 NMETA	
Cink (ejakulátum)	8			
Triptáz	TRYPTA			
Interleukin 2	1 IL2	Melatonin	2 MELA	
Interleukin 2 receptor (solubilis)	1 IL2LR	CT-pro-vasopressin (ADH)	2 3 PAVP	
Szabad kappa könnyűlánc	FKLKS	IGF2	1 IGF2	
Szabad lambda könnyűlánc	FLLKS	IGFBP-3	1 IGFBP	
Lipoprotein asszociált foszfolipáz A2 PLAC teszt	LPPLA2	Dihydro-testosteron	DHT	
Lipoprotein profil	6 9 LIPGEL	11-desoxycortisol	DCORT	
Apolipoprotein A1	APOLA1	11-desoxycorticosteron	DOC	
Apolipoprotein A2	APOLA2	Gasztrín	1 SGASTR	
Apolipoprotein B	APOLB	Szerotonin	1 SEROP	GYÚJTOTT VIZELET MENNY.
Apolipoprotein E	APOLE			
Very Long Chained Fatty Acid (VLCFA)	VLCFA	Thyroxine-Binding Globulin	TBG	L/24h
Sejtsírsav profil	5 9	Hisztamin	1 HISTA	
<b>Egyedi ALLERGEN (külön kérelpon!)</b>	♦ db0	<b>HORMON VIZSGÁLTATOK VIZELETBŐL</b>		<b>MINTAVÉTELI ÚTMUTATÓ</b>
(Phadia ImmunoCap módszer)		Metanephrin (gyűjtött vizelet)	♦ 4 META23	1 Azonnal centrifugálni, a felülúszót fagyasztni kell! Natív minta 20 perc után fuvalandó.
Quantiferon	6 9 TBQUAN	Normetanephrin (gyűjtött vizelet)	♦ 4 NMETA23	2 Aznap fagyasztható! Vérminta esetén felülúszót fagyasztható!
Válasszon a legördülő listából, vagy írja be a Quantiferon vizsgálat célját!		Katecholaminok (adr.noradr.dopam) (gyűjtött vizelet)	♦ 4 KATE	
		Szteroid hormon profil (gyűjtött vizelet)	STERPU	3 8h-s éhezés/szomjazás után (endokrinológiai javaslat alapján)
		Hisztamin (random vizelet)	10 HISTUK	4 24h-s gyűjtött vizelet. A gyűjtés 10 g bórsavra történjen!
		Jód vizsgálat (gyűjtött vizelet)	IUT	5 A mintát fénytől védeni kell! (alufóliába tekerendő)
		<b>TUMORMARKEREK</b>		
TNF-alfa	1 CH50	SCC	2 SCC	6 A vizsgálat megrendeléséhez időpont egyeztetés szükséges az ügyfélszolgálatl!
CH50	1 CH50	Vasoaktív intestinal peptid (VIP)	1 VIP	7 4 órán belül a laborba kell juttatni, fűgálni, fagyasztni!
Desmoglein-1 antitest	DES1	CA-50	CA50	8 A mintát azonnal fagyasztni kell!
Desmoglein-3 antitest	DES3	HER-2 új onkogén	HER2	9 4C-on tárolható, fagyasztni tilos!
GAD	GAD	Neopterin	5 NEOP	10 10 ml random vizelet azonnal fagyasztnva
Tirozin-foszfátáz (IA2)	IA2	Timidin kináz	2 TK	11 Szobahőmérsékleten tárolható és szállítható, hűteni és fagyasztni tilos!
Inzulin elleni antitest	IAA	ColonAiQ	5 11 ColonAiQ	
Terápiás humán inzulin elleni antitest	INSA	<b>Prosztata Pro Panel (PHI)</b>		
Foszfatidil-inozitol elleni at.		<b>SZÉKLETVIZSGÁLTATOK</b>		
Cink-transzporter 8 elleni antitest	ZNT8	Széket α-1 antitripszin	2 AATST	
Gangliozid elleni antitest profil, alap	GANGKL	Széket β defenzin	2 BDEFST	
Gangliozid elleni antitest profil, teljes	GANGGR	Széket albumin	2 ALBST	
Anti-MUSK antitest	RTYRA	Széket eosinophyl protein X	2 EPXST	
Anti-Titin	TITIN	Széket emésztettség	2 VERDA	
		Széket flóra status	6 9 SBY	<b>MINTAVÉTEL</b>
Harántcsikolt izom elleni at.		Lelet: magyarul	6 9 HISST	N (sárga, natív)
MAG-IgM		Széket hisztamin	2 HISST	V (vizeletes cső)
		Széket laktoferrin	2 LACST	SK (spec.kanalis tartály!)
		Széket pancreas specifikus elasztáz	2 BELA1S	SK (kék dugós, citratos cső)
		Széket PMN elasztáz	2 PMNEST	SK L (lila, EDTA-s)
		Széket szekretoros IgA	2 IGAST	SK LX (trasyloi-EDTA-s cső)
		Széket epesav	2 GALST	SK Q (Quantiferon szett)
				S (CWBio, homokszínű)

**Preanalitikai információ:**

- ♦ 2-3 nappal vérvétel előtt, illetve vizeletgyűjtés előtt már kerülje az alábbiakat! Étel: kakaó, kávé, tea, csokoládé, dió, citrusfélék, vanília
- Gyógyszerek (előzetes orvosi egyeztetést követően!): alfa-metildopa, L-Dopa, catecholamin tartalmú gyógyszerek (orcsepp, hörgőtágító, köhögéscsillapító), vérnyomásra szedett gyógyszerek: ACE gátló, kalcium antagonisták, alfa2 mimetikumok, teofillin, fenotiazinok, triciklikus antidepresszánsok, alfa1 és béta antagonisták, alfa1 mimetikumok, nitroglicerín, nitroprusszid nátrium.
- ♦ Az egyedi allergén típusát külön kell jelölni az **EGYEDI ALLERGEN KÉRŐLAPON!**